Figura 2

Figura 1

1. Colocar la pierna del bebé a un nivel mas bajo de su corazón;
2. Calentar el talon del neonato de 3 a 5 minutos, con una gasa humedecida en agua tibia a 41° C;
3. Limpiar el talon del bebe con una gasa estéril embebida en alcohol;
4. Punzar la piel del talon donde indica el área sombreada (Fig. 1). Emplear una lanceta estéril con punta no mas larga de 2.4mm;
5. Destacar la primera gota de sangre limpiando la superficie del talon con una gasa embebida en alcohol;
6. Rozar la gota de sangre con el centro del círculo, y llenar cada círculo con una sola gota que atraviese el papel (Fig. 2), sin aplicar sangre a ambos lados del papel;
7. Dejar secar las muestras de sangre en posición horizontal, sin superponerse, como mínimo 6 horas;
8. Verificar la información de cada muestra, guardar con desecante e invertir las sin superponer las gotas de sangre seca. Refrigerar o enviar a los centros con urgencias.

Instrucciones para la extracción de muestra de muestra del talon

TEST DEL PIECITO

Detección de Errores Congénitos en el Recién Nacido

Institución Solicitante:.....

Código de Muestra:.....

Nº de Historia Clínica.....

Datos del BEBE:

Apellidos/s:.....

Nombre/s:.....

Fecha de Nacimiento:..... Hora:.....

Peso: kg..... Sexo: M F

Parto: Normal Cesárea Múltiple

Semanas de Gestación:..... A Término Prematuro

Alimentación: Leche Materna Leche Fórmula Parenteral

Fecha 1ª. Ingesta de Leche:..... Hora:.....

Transfusión: Sí No Fecha:.....

Desinfectante Iodados: Sí No Fecha:.....

Medicación Recien Nacido: Sí No ¿Cuál?:.....

-Tomar la muestra al BEBE 24hs. despues de haber recibido la alimentación.

-Enviar la muestra antes de los 7 días de vida.

Figura 2

Figura 1

1. Colocar la pierna del bebé a un nivel mas bajo de su corazón;
2. Calentar el talon del neonato de 3 a 5 minutos, con una gasa humedecida en agua tibia a 41° C;
3. Limpiar el talon del bebe con una gasa estéril embebida en alcohol;
4. Punzar la piel del talon donde indica el área sombreada (Fig. 1). Emplear una lanceta estéril con punta no mas larga de 2.4mm;
5. Destacar la primera gota de sangre limpiando la superficie del talon con una gasa embebida en alcohol;
6. Rozar la gota de sangre con el centro del círculo, y llenar cada círculo con una sola gota que atraviese el papel (Fig. 2), sin aplicar sangre a ambos lados del papel;
7. Dejar secar las muestras de sangre en posición horizontal, sin superponerse, como mínimo 6 horas;
8. Verificar la información de cada muestra, guardar con desecante e invertir las sin superponer las gotas de sangre seca. Refrigerar o enviar a los centros con urgencias.

Instrucciones para la extracción de muestra de muestra del talon

TEST DEL PIECITO

Detección de Errores Congénitos en el Recién Nacido

Institución Solicitante:.....

Código de Muestra:.....

Nº de Historia Clínica.....

Datos del BEBE:

Apellidos/s:.....

Nombre/s:.....

Fecha de Nacimiento:..... Hora:.....

Peso: kg..... Sexo: M F

Parto: Normal Cesárea Múltiple

Semanas de Gestación:..... A Término Prematuro

Alimentación: Leche Materna Leche Fórmula Parenteral

Fecha 1ª. Ingesta de Leche:..... Hora:.....

Transfusión: Sí No Fecha:.....

Desinfectante Iodados: Sí No Fecha:.....

Medicación Recien Nacido: Sí No ¿Cuál?:.....

-Tomar la muestra al BEBE 24hs. despues de haber recibido la alimentación.

-Enviar la muestra antes de los 7 días de vida.